

Carte patient pour une utilisation sûre **Dabigatran Spirig HC®**

Dabigatran étexilate

- **Vous devez toujours avoir votre carte patient sur vous**
- **Assurez-vous d'utiliser la version la plus récente**

Chère patiente, cher patient,

Votre médecin a commencé à vous prescrire un traitement par Dabigatran Spirig HC®. Afin que vous puissiez utiliser Dabigatran Spirig HC® en toute sécurité, veuillez lire les informations importantes de la notice d'emballage.

Cette carte patient contient des informations importantes sur votre traitement. Vous devez l'avoir sur vous à tout moment afin d'informer les professionnels de santé de la prise de Dabigatran Spirig HC®.

Dabigatran Spirig HC®: informations destinées aux patients

À propos de votre traitement

- Dabigatran Spirig HC® fluidifie le sang. Il est utilisé pour éliminer les caillots sanguins existants ou pour prévenir la formation de caillots sanguins dangereux.
- Suivez scrupuleusement les instructions de votre médecin pendant le traitement par Dabigatran Spirig HC®. Ne manquez aucune dose et n'arrêtez pas de prendre Dabigatran Spirig HC® sans avoir préalablement consulté votre médecin.
- Indiquez à votre médecin tous les médicaments que vous prenez actuellement.
- Avant toute intervention chirurgicale ou invasive, informez votre médecin que vous prenez Dabigatran Spirig HC®.
- Les gélules de Dabigatran Spirig HC® peuvent être prises indépendamment des repas. Les gélules doivent être avalées entières avec un verre d'eau. Les gélules ne doivent pas être cassées ou mâchées et leur contenu ne doit pas être vidé.

Quand devez-vous consulter un médecin?

- La prise de Dabigatran Spirig HC® peut augmenter le risque de saignements. Informez immédiatement votre médecin si vous présentez des signes et symptômes de saignement, tels que: enflure, malaise, douleurs ou maux de tête inexplicables, vertiges, pâleur, sensation de faiblesse, hématomes inexplicables, saignements de nez, saignements de gencives, coupures saignant anormalement longtemps, troubles menstruels ou saignements du vagin, sang dans l'urine (urine rose ou brune), selles rouges/noires, toux de sang, vomissements de sang ou vomissements ressemblant au marc de café.

- En cas de chute ou de blessure, notamment blessures à la tête, consultez un médecin de toute urgence.
- N'arrêtez pas de prendre Dabigatran Spirig HC® sans avoir préalablement consulté votre médecin si vous avez des brûlures d'estomac, des nausées, des vomissements, des maux d'estomac, des ballonnements ou des douleurs dans la partie supérieure de l'abdomen.

Dabigatran Spirig HC®: Informations destinées aux professionnels de santé

- Dabigatran Spirig HC® est un anticoagulant oral (inhibiteur direct de la thrombine).
- Dans certaines circonstances, la prise de Dabigatran Spirig HC® doit être interrompue avant une intervention chirurgicale ou d'autres mesures invasives.
- En cas d'hémorragies sévères, la prise de Dabigatran Spirig HC® doit être interrompue immédiatement.
- Un antidote spécifique (idarucizumab) est disponible pour les patients adultes.
Pour plus de détails et d'informations sur la manière de contrer l'effet anticoagulant de Dabigatran Spirig HC®, veuillez consulter les informations professionnelles de Dabigatran Spirig HC® et de l'idarucizumab.
- Dabigatran Spirig HC® est principalement éliminé par les reins; une diurèse suffisante doit être maintenue. Dabigatran Spirig HC® est dialysable.

Veuillez compléter cette section ou demander à votre médecin de le faire pour vous.

Données du patient

(prénom, nom)

(date de naissance (JJ.MM.AAAA))

(indication pour l'anticoagulation)

(dose de Dabigatran Spirig HC®)

Spirig HealthCare SA | CH-4622 Egerkingen
Tél. 062 388 85 00 | www.spirig-healthcare.ch

