

# Informations importantes sur la prise de Lénalidomide Spirig HC®

## Femmes / Prévention de la grossesse

Si vous êtes enceinte, si vous pensez être enceinte ou si vous prévoyez de l'être, vous ne devez pas prendre de Lénalidomide Spirig HC.

Les femmes en âge de procréer ne peuvent prendre ce médicament que si une méthode de contraception très fiable est rigoureusement appliquée.

Les points suivants sont très importants :

1. Avant le début du traitement, votre médecin vérifiera que vous n'êtes pas enceinte. Par la suite, il vous soumettra à un test de grossesse toutes les 4 semaines pendant toute la durée du traitement, ainsi qu'à un dernier test de grossesse 4 semaines après la fin du traitement.
2. Votre médecin ou un autre médecin vous conseillera au sujet des méthodes de contraception appropriées dans votre cas. Vous devez généralement commencer à appliquer ces méthodes 4 semaines avant le début du traitement, et en poursuivre strictement l'application non seulement pendant toute la durée du traitement, pauses de traitement comprises, mais encore pendant les quatre semaines qui suivront le traitement.
3. Si vous êtes enceinte ou si vous pensez que vous pourriez l'être malgré l'application conscientieuse des mesures de contraception pendant votre traitement par Lénalidomide Spirig HC ou au cours des quatre semaines suivant le traitement, vous devez immédiatement en avertir votre médecin.

### Allaitement

On ne sait pas si Lénalidomide Spirig HC passe dans le lait maternel. Par conséquent, Lénalidomide Spirig HC ne doit pas être utilisé pendant la période d'allaitement. Si une patiente qui allait doit être traitée par Lénalidomide Spirig HC, elle devra d'abord sevrer son bébé.

## Hommes / Préservatifs

Le léanalidomide passe dans le sperme. Les patients de sexe masculin ayant une partenaire en âge de procréer devront toujours utiliser des préservatifs pendant le traitement par Lénalidomide Spirig HC, compris les interruptions temporaires et pendant les 7 jours après l'arrêt du traitement.

En outre, les patients ne doivent en aucun cas faire un don de sperme pendant leur traitement par le léanalidomide ou pendant les 7 jours suivant la fin de ce traitement.

## Remarque générale

En raison du risque pour l'enfant à naître, vous ne devez jamais remettre Lénalidomide Spirig HC à une autre personne.

## Confirmation écrite par le patient

Par la présente, je confirme avoir compris qu'il est absolument nécessaire d'éviter une grossesse sous traitement par Lénalidomide Spirig HC.

Nom \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

Signature \_\_\_\_\_