



CARTE PATIENT POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ

Tériméthomide Spirig HC®

Veuillez également consulter l'information destinée aux patients
Tériméthomide Spirig HC® www.swissmedicinfo.ch

Remarques générales:

Veuillez montrer la présente carte à tous les médecins ou professionnels de santé qui vous prennent en charge (p. ex. en cas d'urgence).

Cette carte patient contient des informations importantes sur la sécurité dont vous devez être informé(e) lors d'un traitement par le tériméthomide. Veuillez lire attentivement la présente carte et l'information destinée aux patients.



Effets secondaires importants

- Ce médicament peut avoir un impact sur votre fonction hépatique, votre tension artérielle et certaines cellules sanguines importantes pour la lutte contre les infections.

Sie vous remarquez l'un des effets secondaires suivants, veuillez vous adresser immédiatement à votre médecin:

- Coloration de la peau ou de la partie blanche des yeux, urine foncée, perte d'appétit, nausées, vomissements, douleurs abdominales, abattement, démangeaisons. Ceci pourrait indiquer la présence d'un problème au niveau de votre foie.
- Température élevée (fièvre), toux, frissons, ganglions lymphatiques enflés, écoulement urinaire diminué ou douloureux. Ceci pourrait indiquer que vous avez une infection.

Pour les femmes en âge de procréer, y compris les filles et leurs parents ou soignants

- **Ne commencez pas le traitement par le tériflunomide si vous êtes enceinte ou si vous pensez que vous êtes enceinte.** Votre médecin vous demandera peut-être d'effectuer un test de grossesse par mesure de précaution.



- Pendant le traitement par le tétriflunomide, utilisez une **méthode de contraception fiable**. Ceci est également nécessaire pendant un certain temps après le traitement. Votre médecin vous conseillera et vous informera des risques éventuels pour l'enfant à naître et de la nécessité d'utiliser une méthode contraceptive fiable.
- Pour les filles et leurs parents ou soignants: Veuillez informer le médecin lorsque les premières menstruations surviennent. Votre médecin vous conseillera et vous informera des risques éventuels pour l'enfant à naître en cas de grossesse et de la nécessité d'utiliser une méthode contraceptive fiable.
- Si vous changez de méthode contraceptive ou si vous souhaitez tomber enceinte, informez-en votre médecin.

Si vous tombez enceinte ou pensez que vous êtes enceinte:

- Arrêtez de prendre le tétriflunomide et **informez immédiatement votre médecin**.
- Votre médecin vous recommandera peut-être un traitement par certains médicaments afin d'éliminer rapidement le tétriflunomide de votre organisme.
- Veuillez également consulter votre médecin si vous **allaitez** ou si vous avez l'intention d'allaiter.

Spirig HealthCare SA
Industriestrasse 30
4622 Egerkingen

Téléphone: +41 62 388 85 88
Fax: +41 62 388 85 85

E-Mail: info@spirig-healthcare.ch
www.spirig-healthcare.ch

Nom de la patiente ou du patient:

Date de la première ordonnance de tériméthomide:

Nom du centre de traitement:

Nom du médecin traitant:

Numéro de téléphone du médecin traitant:

Nom du médecin prescripteur:
