



TESSERA DEL PAZIENTE PER UN USO IN SICUREZZA

Teriflunomide Spirig HC®

Si prega di consultare anche l'informazione destinata ai pazienti di Teriflunomid Spirig HC® www.swissmedicinfo.ch

Avvertenze generali:

La preghiamo di mostrare questa tessera a tutti i medici o specialisti sanitari che l'assistono (es. in caso di emergenza).

Questa tessera del paziente contiene importanti informazioni sulla sicurezza che deve conoscere in caso di trattamento con teriflunomide. Si prega di leggere attentamente questa tessera e l'informazione per i pazienti



Importanti effetti collaterali

- Questo medicamento può avere effetti sulla funzionalità del fegato, sulla pressione arteriosa e su alcune cellule del sangue, importanti per la difesa contro le infezioni.

Se compare uno dei seguenti effetti collaterali, si rivolga subito al suo medico:

- Colorazione giallastra della pelle o della parte bianca degli occhi, urine scure, inappetenza, nausea, vomito, dolori addominali, abbattimento, prurito. Si potrebbe trattare di un problema del fegato.
- Temperatura elevata (febbre), tosse, brividi, ingrossamento dei linfonodi, urinazione diminuita o dolorosa. Si potrebbe trattare di un'infezione.

Per le donne in età fertile, comprese le ragazze e i loro genitori/tutori

- **Non inizi il trattamento con la teriflunomide se è in gravidanza o sospetta di esserlo.** Il medico le potrebbe chiedere di eseguire un test di gravidanza come misura precauzionale.



- Durante il trattamento con la teriflunomide, utilizzi un **metodo contraccettivo affidabile**. Ciò è necessario anche per un certo periodo di tempo dopo il trattamento. Il medico la consiglierà e le fornirà informazioni sui possibili rischi per il nascituro e sulla necessità di un metodo contraccettivo affidabile.
- Per le ragazze e i loro genitori/tutori: Informi il medico quando compaiono le prime mestruazioni. Il medico la consiglierà e le fornirà informazioni sui possibili rischi per il nascituro in caso di gravidanza e sulla necessità di utilizzare un metodo contraccettivo affidabile.
- Informi il medico se cambia il metodo contraccettivo o se desidera una gravidanza.

In caso di gravidanza o sospetto di gravidanza

- Sospenda l'assunzione di teriflunomide e **informi subito il medico**.
- Il medico potrebbe consigliare l'assunzione di alcuni farmaci per eliminare rapidamente la teriflunomide dall'organismo.
- Consulti il suo medico anche se **allatta** o desidera allattare.

Spirig HealthCare SA
Industriestrasse 30
4622 Egerkingen

Telefono: +41 62 388 85 88
Fax: +41 62 388 85 85

E-mail: info@spirig-healthcare.ch
www.spirig-healthcare.ch

Nome della/del paziente:

Data della prima prescrizione di teriflunomide:

Nome del centro di trattamento:

Nome del medico curante:

Numero di telefono del medico curante:

Nome del medico prescrittore:
