

Patientenkarte zur sicheren Anwendung Dabigatran Spirig HC®

Dabigatranetexilat

- **Sie sollten die Patientenkarte immer mit sich führen**
- **Stellen Sie sicher, dass Sie die aktuellste Version verwenden**

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

Ihr Arzt hat bei Ihnen eine Behandlung mit Dabigatran Spirig HC® begonnen. Damit Sie Dabigatran Spirig HC® sicher anwenden können, beachten Sie bitte die wichtigen Informationen in der Packungsbeilage.

Diese Patientenkarte enthält wichtige Informationen über Ihre Behandlung. Sie sollten sie jederzeit bei sich tragen, um medizinisches Fachpersonal über die Einnahme von Dabigatran Spirig HC® zu informieren.

Dabigatran Spirig HC®: Informationen für Patienten

Über Ihre Behandlung

- Dabigatran Spirig HC® verdünnt das Blut. Es wird angewendet, um bestehende Blutgerinnsel zu behandeln oder der Bildung von gefährlichen Blutgerinnseln vorzubeugen.
- Halten Sie sich während der Behandlung mit Dabigatran Spirig HC® genau an die Anweisungen Ihres Arztes. Lassen Sie keine Dosis aus und setzen Sie Dabigatran Spirig HC® nie ohne vorherige Rücksprache mit Ihrem Arzt ab.
- Nennen Sie Ihrem Arzt alle Arzneimittel, die Sie zurzeit anwenden.
- Informieren Sie Ihren Arzt vor jedem chirurgischen oder invasiven Eingriff über die Einnahme von Dabigatran Spirig HC®.
- Dabigatran Spirig HC® Hartkapseln können unabhängig von den Mahlzeiten eingenommen werden. Die Kapseln sollten im Ganzen mit einem Glas Wasser geschluckt werden. Die Kapseln dürfen nicht zerbrochen oder gekaut werden und der Kapselinhalt darf nicht ausgeleert werden.

Wann müssen Sie medizinischen Rat suchen?

- Die Einnahme von Dabigatran Spirig HC® kann das Risiko für Blutungen erhöhen. Informieren Sie umgehend Ihren Arzt, wenn bei Ihnen Anzeichen und Symptome einer Blutung auftreten, z.B.: Schwellung, Unwohlsein, unerklärliche Schmerzen oder Kopfschmerzen, Schwindel, Blässe, Schwächegefühl, unerklärliche Blutergüsse, Nasenbluten, Zahnfleischbluten, ungewöhnlich lang blutende Schnittwunden, Menstruationsstörungen oder Blutungen aus der Vagina, Blut im Urin (mit Rosa- oder Braunfärbung des Urins), roter/schwarzer Stuhl, Bluthusten, Erbrechen von Blut oder kaffeefarbiges Erbrechen.

- Im Falle eines Sturzes oder bei Zuziehen einer anderen Verletzung, insbesondere Kopfverletzungen, suchen Sie dringend medizinischen Rat.
- Setzen Sie Dabigatran Spirig HC® nicht ohne vorherige Rücksprache mit Ihrem Arzt ab, wenn bei Ihnen Sodbrennen, Übelkeit, Erbrechen, Magenbeschwerden, Blähungen oder Schmerzen im Oberbauch auftreten.

Dabigatran Spirig HC®: Informationen für medizinisches Fachpersonal

- Dabigatran Spirig HC® ist ein orales Antikoagulans (direkter Thrombininhibitor).
- Unter Umständen muss die Einnahme von Dabigatran Spirig HC® vor chirurgischen oder anderen invasiven Massnahmen unterbrochen werden.
- Falls schwere Blutungen auftreten, muss die Einnahme von Dabigatran Spirig HC® sofort unterbrochen werden.
- Für erwachsene Patienten steht ein spezifisches Antidot (Idarucizumab) zur Verfügung. Einzelheiten und weitere Informationen, wie der antikoagulatorischen Wirkung von Dabigatran Spirig HC® entgegengewirkt werden kann, finden Sie in den Fachinformationen zu Dabigatran Spirig HC® und Idarucizumab.
- Dabigatran Spirig HC® wird hauptsächlich über die Nieren ausgeschieden; es muss eine ausreichende Diurese aufrechterhalten werden. Dabigatran Spirig HC® ist dialysierbar.

Bitte füllen Sie diesen Abschnitt aus oder bitten Sie Ihren Arzt, es für Sie zu tun.

Patientendaten

(Vorname, Nachname)

(Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ))

(Indikation für Antikoagulation)

(Dosis von Dabigatran Spirig HC®)

Spirig HealthCare AG | CH-4622 Egerkingen
Tel. 062 388 85 00 | www.spirig-healthcare.ch



 spirig HealthCare
STADA GROUP